

مقاله پژوهشی

بررسی شیوع و علل حاملگی‌های ناخواسته از دیدگاه زنان باردار

منیژه سرشتی^{*}، معصومه دلارام^{*}، دکتر محمود رفیعیان^{**}

چکیده

مقدمه و هدف: حاملگی ناخواسته در تمام جوامع و با هر وضعیت اجتماعی و اقتصادی اتفاق می‌افتد و موجب افزایش هزینه‌های اجتماعی و پزشکی می‌شود. این تحقیق به منظور تعیین علل و میزان شیوع حاملگی‌های ناخواسته از دیدگاه زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان هاجر شهر کرد انجام گردید.

روش کار: به منظور انجام این پژوهش توصیفی مقطعی ۱۹۲۵ مادر باردار در بخش‌های زنان و زایمان و جراحی زنان بیمارستان هاجر مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه مبتنی بر هدف تهیه و از طریق مصاحبه حضوری تکمیل گردید. روش نمونه‌گیری غیرتصادفی و مبتنی بر هدف بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری کای دو و تی دانشجویی استفاده شد.

یافته‌ها: میزان حاملگی ناخواسته در این پژوهش ۲۷/۲ درصد بود ۵۴ درصد افراد مورد مطالعه پیشگیری از بارداری نداشتند. میانگین سن افراد مورد مطالعه $5/36 \pm 2/25$ بود. از نظر تحصیلات ۷ درصد بیسوساد، ۲۹/۲ ابتدایی، ۲۰ درصد راهنمایی، ۳۶/۱ درصد دبیرستانی، ۷/۷۱ درصد تحصیلات دانشگاهی داشتند. درصد نخست حامله و ۵۷/۳ درصد چند زا بودند. ۵۰ درصد افرادی که حاملگی ناخواسته داشتند علت حاملگی خود را استفاده نامرتب از وسیله پیشگیری از بارداری اعلام کرده‌اند. بر اساس نتایج آزمون t بین سن، تعداد حاملگی، تحصیلات و حاملگی ناخواسته ارتباط معنی دار وجود داشت ($P < 0.0001$). بین روش پیشگیری از بارداری و حاملگی ناخواسته ارتباط معنی دار وجود داشت ($P < 0.0001$). درصد افرادی که حاملگی ناخواسته داشتند علت حاملگی خود را استفاده نامرتب از وسیله پیشگیری از بارداری اعلام کرده‌اند. فراموشی در مصرف فرقن، ترس از عوارض و نازایی، راهنمایی غلط پزشک و پرسنل بهداشتی درمانی، عوارض حین استفاده از روش پیشگیری، مصرف همزمان دارو با قرص، عدم استفاده از روش پیشگیری در دوران شیردهی از مواردی است که توسط افراد مورد مطالعه به عنوان علت حاملگی ناخواسته ذکر شده است.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش مبنی بر شیوع بالای حاملگی ناخواسته در استفاده کنندگان وسایل پیشگیری از بارداری، ضرورت نظارت بیشتر بر جنبه‌های کیفی ارائه خدمات تنظیم خانواده و توجه ویژه به امر مشاوره باید مورد تأکید قرار گیرد.

کلید واژه‌ها: حاملگی ناخواسته / زنان حامله / شیوع / شهر کرد

* اعضاء هیئت علمی گروه مامائی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

** استاد و عضو هیئت علمی گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

روش کار

این بررسی توصیفی- مقطعي در فاصله زمانی ۸۱/۴/۲ تا ۸۲/۷/۲ در بیمارستان هاجر شهرکرد انجام شده است . ۱۹۲۵ مادر باردار مراجعه کننده به بخش‌های زنان و زایمان و جراحی زنان که جهت سقط یا عوارض حاملگی و زایمان مراجعه کرده بودند ، مورد بررسی قرار گرفتند . روش نمونه گیری غیر تصادفی از روش آسان و مبتنی بر هدف بود .

ابزار گردآوری داده ها فرم مصاحبه بود که از دو بخش اطلاعات فردی و سوالات تخصصی تشکیل شده بود و جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری توسط دو نفر کارشناس ارشد مامایی بر بالین مادر باردار انجام شد . سوالات فرم مصاحبه بصورت باز بود . تعیین اعتبار علمی فرم مصاحبه از طریق نظرات کارشناسان و مطالعه کتب مرجع و مجلات انجام شدو جهت تعیین پایایی ارزامون مجدد استفاده شد . جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد و آزمون های اماری مورد استفاده شامل آمار توصیفی و آزمون های آنالیزی و بود .

نتایج

متولdest سن واحدهای پژوهش $5/36 \pm 25/2$ بود حداقل سن ۱۴ و حداکثر ۴۸ سال بود . از نظر تحصیلات ۷ درصد بیسوساد ۲۹/۲ ، ابتدایی ۲۰ ، درصد راهنمایی ۳۶/۱ درصد دبیرستانی ۷/۷ درصد تحصیلات دانشگاهی داشتند . درصد واحدهای پژوهش خانه دارو ۷/۵ درصد شاغل بودند . ۵۵ درصد ساکن روستا و ۴۵ درصد ساکن شهر بودند . متولdest سن حاملگی $34/5 \pm 9/6$ هفته و حداقل سن حاملگی ۴ هفته حداکثر ۴۲ هفته بود . ۴۲ درصد نخست زا و $57/3$ درصد چند زا بودند . ۵۴ درصد افراد (۱۰۳۹ نفر) مورد مطالعه از هیچ‌گونه روش پیشگیری از بارداری استفاده نمی کردند که میزان حاملگی ناخواسته در این گروه (۱۲۵ نفر) ۱۲ درصد بود . علت عدم استفاده از روش پیشگیری از بارداری تمایل به حاملگی (٪ ۹۳/۵) شیردهی، ترس از نازایی به دنبال مصرف قرص در کسانی که تاکنون حامله نشده اند و اعتقاد به

متدها

مسئله افزایش بی رویه جمیعت یکی از مسائل مهمی است که تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار می دهد . (۱) حاملگی ناخواسته در تمامی زیادها و در هر وضعیت اجتماعی و اقتصادی اتفاق می افتد . در حدود ۵۰ درصد حاملگی ها در آمریکا ناخواسته می باشند و تقریبا ۴۸ در صد همه خانمهایی که سن ۱۵ تا ۴۴ سال دارند حداقل یک بار حاملگی ناخواسته را تجربه کرده اند (۲) . سالیانه در حدود ۵۰ میلیون مورد از حاملگی ناخواسته بطور عمده سقط می‌شوند و حدود ۲۰ میلیون از این سقط ها در شرایط غیر ایمن صورت می گیرد ، در حدود ۹ میلیون مورد آن در کشورهای در حال توسعه انجام می شود و موجب مرگ بیش از ۲۰۰ زن در هر روز می شود . سقط عفونی به دنبال حاملگی ناخواسته یکی از پنج عامل مهم مرگ و میر مادران می باشد (۳) . حاملگی های ناخواسته موجب افزایش شیوع سقط عمده ، وزن کم هنگام تولد ، شروع دیر هنگام مراقبت های دوران بارداری و افزایش عوارض جسمی و روانی مختلف مادر و کودک می شود . همچنین حاملگی ناخواسته موجب تحمیل بار مالی بر سلامت ملی می شود (۴) . مطالعات نشان داده است که ۳۰۰ میلیون زوج در جهان از روش پیشگیری از بارداری خود ناراضی هستند . گرچه رابطه جنسی ، حاملگی و تولد فرزند جزء جدایی ناپذیر از زندگی بشر در هر مکانی محسوب می شود . محیط فرهنگی و اجتماعی در این موارد آنچنان متنوع هستند ، که باعث می شوند روشها و وسائل پیشگیری از بارداری در تمام مکانهای بصورت یکسان پذیرفته نشوند . میزان شکست روشها پیشگیری از بارداری در جوامع مختلف ، متفاوت است . بنابراین نیاز به ادامه تحقیقات گوناگون در مورد روشها که سالمتر ، مؤثرتر و قابلیت پذیرش عمومی تر داشته باشند ، ضروری بنظرمی رسد (۱) . از این رو با توجه به متغیر بودن میزان شیوع و علل بارداری ناخواسته در جوامع مختلف ، این پژوهش به منظور تعیین شیوع و علل احتمالی بارداری ناخواسته در سال ۸۱-۸۲ در شهرکرد انجام گرفت .

قرص شیردهی مصرف شده بود ، حاملگی نا خواسته گزارش شده است. ($P<0.0001$)

علت حاملگی از دیدگاه استفاده کنندگان از آمپولهای پروژسترونی ۲۰ درصد موارد عدم دسترسی به دارو به علت تعطیلی درمانگاه و یا عدم وجود آمپول در مرکز بهداشتی و درمانی بود و ۸۰ درصد عدم استفاده از دارو در موعد مقرر به علت خونزی غیر طبیعی و آمنوره ذکر شد.

علت حاملگی از دیدگاه مصرف کنندگان OCP در ۵۱/۱ درصد موارد مصرف نامرتب قرص، ۱۵/۳ درصد استفاده همزمان از دارو به همراه قرص وسایر علل ذکر شده از توسط واحدهای پژوهش مصرف نامتناسب قرص ، راهنمایی غلط پرشك ، فراموشی در مصرف قرص و فاسد بودن قرص بود و در ۵/۴ درصد علت حاملگی از دیدگاه آنان نامشخص بود و گفته اند که علیرغم استفاده مرتب از OCP حامله شده اند.

۳۷/۶ درصد افرادی که دچار حاملگی ناخواسته شدند در آخرین ماه قبل از حاملگی بطور نامرتب از وسایل پیشگیری از بارداری استفاده کردند که علت آن را کاهش عوارض و نازابی و همچنین عدم حضور مداوم همسر (در کسانی که همسر آنان در شهر یا کشور دیگری سکونت داشتند) ذکر کردند. بین استفاده نامرتب از وسیله پیشگیری از بارداری در ماه قبل از حاملگی و حاملگی ناخواسته ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد. ($P<0.0001$)

۶۰/۳ درصد واحدهای پژوهش اعلام کردند که جهت استفاده از وسیله پیشگیری آموزش دریافت کرده اند و ۳۹/۷ درصد گفته اند که هنگام دریافت وسیله هچگونه آموزشی دریافت نکرده اند. بین دریافت آموزش و حاملگی ناخواسته ارتباط معنی دار وجود دارد. ($P=0.022$)

محل کسب این اطلاعات در این مطالعه ۷۱/۵ درصد موارد مراکز بهداشتی، ۱۱ درصد مشاورین هنگام ازدواج و در سایر موارد اطلاعات از طریق کتاب ، صدا و سیما ، فامیل و آشنايان ذکر شده بود. در ۹۹/۹ درصد موارد محل تهیه وسیله پیشگیری از بارداری مراکز بهداشتی بوده و فقط ۱/ درصد موارد از داروخانه تهیه شده بود.

این مسئله که کسانی که مدت طولانی قرص مصرف کرده اند دیگر حامله نمی شوند و نیاز به پیشگیری از بارداری ندارند.

اکثریت افراد (۲۳/۸٪) مورد مطالعه از قرصهای پیشگیری از بارداری و ۲۲/۲ درصد از سایر روش ها استفاده می کرند. (جدول شماره یک)

میزان حاملگی ناخواسته در مصرف کنندگان آمپولهای پروژسترونی (۱۶ نفر) ۸۰ درصد، (کاندولوم ۳۵ نفر) ۵۷،۱ درصد، قرص (۱۵ نفر) ۴۶ درصد، روش مقایبت منقطع (۱۰۷ نفر) ۳۹،۸ درصد، در IUD (۱۷ نفر) ۳۰ درصد و کلیه افرادی که تویکتسومی (۴ نفر) شده بودند تمام حاملگی های ناخواسته بوده است. میزان حاملگی ناخواسته در این مطالعه بطور کلی ۲۷،۲ درصد بود . بین محل سکونت ، سن حاملگی ، شغل و حاملگی ناخواسته، ارتباط معنی داری وجود نداشت .

بررسی میزان حاملگی ناخواسته بر حسب میزان تحصیلات مادران نشان می دهد که با بالا رفتن سطح سواد میزان حاملگی ناخواسته کم میشود و بیشترین میزان حاملگی ناخواسته در مادران بیسوساد (۵۱،۵٪) و کمترین میزان حاملگی در مادرانی است که تحصیلات دبیرستانی داشته اند. بر اساس آزمون تی داشجوبی بین میزان تحصیلات و حاملگی ناخواسته ارتباط معنی دار وجود داشت. ($P<0.0001$)

بر اساس آزمون کای دوبین نوع روش پیش گیری از بارداری و حاملگی ناخواسته ارتباط معنی دار وجود داشت ($P<0.0001$) به گونه ای که بیشترین میزان حاملگی ناخواسته مربوط به آمپولهای تزریقی پروژسترونی می باشد که حدود ۸۰ درصد موارد حاملگی ناخواسته داشته اند. کمترین میزان حاملگی ناخواسته در بین استفاده کنندگان از IUD دیده شد و بیشترین وسیله پیشگیری از بارداری مورد استفاده قرص بوده است و بیشترین قرص مورد استفاده LD (۹۱/۳٪) قرص بوده است. بین نوع قرص مصرفی و حاملگی ناخواسته ارتباط معنی دار وجود داشت به گونه ای که تمامی مواردی که

جدول ۱: توزیع فراوانی واحدهای پژوهش بر اساس روش پیشگیری از بارداری

درصد	تعداد	فراوانی روش پیشگیری
۵۴	۱۰۳۹	بدون پیشگیری
۲۳/۸	۴۵۷	قرص های خوراکی
۱۴	۲۶۹	مقاریت منقطع
۳/۲	۶۲	کاندوم
۳	۵۸	IUD
۱	۲۰	دیومدرکسی پروژسترلون
۱/۲	۴	توبکتومی
۱/۲	۴	نوروپلات
۱/۶	۱۲	دو روش همزمان
۱۰۰	۱۹۲۵	جمع

جدول ۲: توزیع فراوانی خواسته یا ناخواسته بودن بارداری بر حسب سن

نتیجه آزمون	جمع		ناخواسته		خواسته		پذیرش بارداری سن(سال)
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	
P<0.0001	۱۰۰	۲۸۵	۱۳/۳	۳۸	۸۶/۷	۲۴۷	۱۴-۱۹
	۱۰۰	۱۲۰۸	۲۳/۶	۲۸۵	۷۶/۴	۹۲۳	۲۰-۲۹
	۱۰۰	۴۰۶	۴۴/۳	۱۸۰	۵۵/۷	۲۲۶	۳۰-۳۹
	۱۰۰	۲۶	۸۰/۷	۲۱	۱۹/۳	۵	۴۰-۴۸
	۱۰۰	۱۹۲۵	۲۷/۲	۵۲۴	۷۲/۸	۱۴۰۱	جمع

نتیجه این تحقیق نشان داد ۵۴ درصد زنان مورد مطالعه پیشگیری از بارداری نداشتند که ۱۲ درصد این افراد حاملگی ناخواسته داشته اند . آنان معتقد بودهند که در دوره شیردهی و یا تازمانی که بعد از زایمان فاعلگی شروع نشده ، یا بعد از مصرف طولانی مدت قرص حامله نمی شوند

بحث

یافته های این پژوهش نشان داد که شیوع حاملگی ناخواسته ۲۷/۲ درصد است که احتمالاً شیوع واقعی حاملگی ناخواسته بیشتر می باشد زیرا خانمهای تمایل ندارند حاملگی ناخواسته ای که با سقط غیر قانونی خاتمه می باید را گزارش نمایند. در مطالعه محمد پور هم میزان حاملگی ناخواسته ۲۸ درصد گزارش شد.(۵)

پاتس^۳ می‌گوید مردان، ۵۰ درصد فراموش شده تنظیم خانواده هستند که اگر از آنها خواسته شود، حاضر به همه نوع همکاری هستند. لذا اگر امکانات لازم برای مردان فراهم آید یا کاندوم در دسترس آنان قرار گیرد، یقیناً مردان استقبال کرده و از آنها استفاده خواهند کرد. پس کلید معملاً در دست ارائه دهنده‌گان این وسائل است نه مصرف کننده‌گان آنان.^(۹)

مطالعه موسوں^۴ و همکاران نشان داد که فقط ۲۰ درصد متخصصین زنان و زایمان و ۲۳ درصد برشکان خانواده در مورد روشهای پیشگیری از بارداری اورزادی هنگام مشاوره تنظیم خانواده صحبت می‌کنند در حالی که بسیاری از هنگام استفاده از روشهای سد کننده پیشگیری از بارداری دچار مشکل می‌شوند.^(۲)

۴۰/۴ درصد واحدهای پژوهش بیان کردند فقط در بار اول دریافت وسیله پیشگیری از بارداری به آنان آموزش داده اند و در مراجعت بعدی صرفاً وسیله پیشگیری از بارداری در اختیار آنان قرار گرفته است و این افراد معتقد بودند که عدم تکرار نکات آموزشی سبب می‌شود در موقع نیاز نتوانیم اقدام مناسب به عمل آوریم. در این رابطه لاجوسکای^۵ می‌گوید استفاده از کارت‌های یادآوری کننده به طور معنی دار موجب پذیرش بهتر روشهای پیشگیری از بارداری، کاهش حاملگی ناخواسته و کاهش سقط‌های عمدی می‌شود.^(۱۰) همچنین در تحقیقی که توسط جانسون^۶ و همکاران انجام شد نشان داده شد که بیشترین شکایت خانمها این بود که آموزشها بطور روتین ارائه می‌شود و براساس نیازهای فردی نمی‌باشد. و بسیاری از خانمها معتقد بودند که آموزش‌های بعد از زایمان کافی نیستند و جهت دستیابی به آموزش کافی نیاز به زمان و اطلاعات بیشتری دارند.^(۱۱)

۲/۵ درصد واحدهای پژوهش علت حاملگی خود را راهنمایی غلط پژشك و پرسنل درمانی اعلام کردند گرچه این میزان کم بنظر میرسد ولی از آن جهت که موارد

در مطالعه ای که توسط بترجی - ان^۱ و همکاران انجام شد ۱۱/۳ درصد خانمها معتقد بودند که شیردهی مانع وقوع حاملگی می‌شود و ۶/۳ درصد موارد از روشهای پیشگیری از بارداری بی اطلاع بودند^(۶) که نتایج این تحقیق با مطالعه ما همخوانی دارد. همچنین نتایج تحقیقات اکیلا-کا^۲ و همکاران نشان داد که آمنوره در دوران شیردهی در زنان مصری بعنوان یک روش بیشگیری از بارداری مهم مطرح می‌باشد و وی یادآوری شود که آموزش در مورد این متد کاملاً ضروری است و بنابراین پیشنهاد می‌شود در مواردی که خانمها مایل نیستند در دوره شیردهی از وسائل پیشگیری از بارداری استفاده کنند، آموزش‌های لازم در باره این روش داده شود تا شناس حاملگی ناخواسته کاهش یابد^(۷)؛ لذا توصیه می‌شود مسئولین و مراقبین بهداشتی درمانی به آموزش‌های بعد از زایمان اهمیت بیشتری بدهند.

در این بررسی میزان شکست روشهای ضد بارداری بیشتر از عدم استفاده از وسائل پیشگیری از بارداری موجب، حاملگی ناخواسته شده است که با گزارش ملک افضلی و کاظمی مطابقت ندارد^(۸) که علل احتمالی آن متفاوت بودن جامعه پژوهش، بیشتر بودن حجم نمونه و نخست زا

بودن حدود نیمی از واحدهای پژوهش بود.
۵۱/۱ درصد مصرف کننده‌گان قرص، علت حاملگی ناخواسته را مصرف نا مرتباً ذکر کردن و علت بی نظمی در مصرف را، اعتقاد به مصرف قرص فقط در هنگام نزدیکی (٪۱۵)، فراموشی، ترس از عوارض و ورود غیرمنتظره همسر ذکر کردند. (با توجه به اینکه در استان چهارمحال و بختیاری همسران تعدادی از خانمها در کشورهای همجوار یا در شهرهای دیگر و دور از خانواده زندگی می‌کنند) و لازم به ذکر است که هیچ یک از این افراد نسبت به روشهای پیشگیری از بارداری اورزادی آگاهی نداشتند و بنابراین، همکاری مناسب همسران آنها و نیز آموزش روشهای پیشگیری از بارداری اورزادی ضروری به نظر می‌رسد. در این زمینه دکتر مالکوم

3-POTTS
4-Moos
5-Lachowsky
6-Johnson

1-Banerjee-N
2 Akila-K

اطلاعات و مهارت آنان در انتقال مطلب به داوطلبین تنظیم خانواده به طور مستقیم بر نتایج تنظیم خانواده تاثیر می گذارد.

نتیجه نهائی

به طور خلاصه می توان گفت که علت اکثر موارد حاملگی ناخواسته استفاده غلط و عدم رضایت از روش های پیشگیری از بارداری مورد استفاده می باشد بنابراین پرسنل بهداشتی باید علاوه بر داشتن دانش کافی در مورد جنبه های مختلف تنظیم خانواده، باید بتوانند به سوالات مددجویان پاسخ گویند و با اختصاص زمان بیشتر طرز استفاده صحیح از وسایل جلوگیری از بارداری را به آنها آموزش داده و عوارض جانبی روشهای پیشگیری را به گونه ای که موجب نگرانی بی مورد نشود، توضیح دهند و مطالب آموزشی را به صورت مکتوب نیز در اختیار زنان قرار دهند و قطعاً بهبود کیفیت در ارائه خدمات تنظیم خانواده می تواند موجب کاهش میزان حاملگی ناخواسته گردد.

تشکر و قدردانی

بدینوسیله نویسندهای این مقاله از پشتیبانی و حمایت های مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد سپاسگزاری می نمایند.

منابع

1. World Health Organization , Reserach on Reproductive Health at WHO Biennial Report Chapter1 - Familiy planning – expa -nding the choices 2000-2001 , 2002:9-23.
2. Moos.Mk.Unintended pregnancies: A call for Nursing , Action. MCN ; American Journal of Maternal/Child Nursing, 2003: 28 (1) : 2 - 30.
3. نوجاوه صدیقه ، لطیفی محمود. بررسی تاثیر حاملگی ناخواسته بر شیردهی طی سه ساعت اول پس از زایمان. اسرار- مجله علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سپزوار، زمستان، ۷۹سال هفتم ، شماره ۱۴، صفحه ۴۹-۳۷.
4. Eggleston E, Tsui AO, Kotelchuck M. Unintended pregnancy and low birth

مذکور اکثرا در افراد بالای ۳۵ سال و حاملگی بیش از ۵ بار اتفاق افتاده و با توجه به خطرات حاملگی در سنین بالا اهمیت زیادی دارد . بررسی شرعیت نیز با نتایج تحقیق ما همخوانی دارد.

شرعیت می نویسد برخی از پزشکان به علت عوارضی نظری سردد ، مشکلات عصبی ، اختلالات گوارشی آمنوره که با مصرف قرصهای ضدبارداری مشاهده شود بدون توجه به شروع روش مطمئن دیگری مصرف قرصهای ضد بارداری را قطع می کنندلذا آموزش پزشکان و همکاری بین آنها و مراکز بهداشتی درمانی ضرورت دارد. (۱۲)

بیشترین میزان حاملگی ناخواسته بعد از بستن لوله ها مربوط به آمپولهای پروژسترونی بوده که در ۸۰ درصد موارد حاملگی ناخواسته بوده و تمامی موارد به علت استفاده نامناسب بوده است و دلیل آن، در ۸۰ درصد موارد خونریزی غیر طبیعی و آمنوره ذکر شده است و ۲۰ درصد موارد عدم دسترسی به آمپول (علت تعطیلی درمانگاه یا عدم وجود آمپول در مراکز بهداشتی و درمانی) بود که لازم است این افراد با عوارض جانبی ، محاسن و معایب روشهای پیشگیری از بارداری آشنا شوند همچنین ترتیبی اتخاذ شود تا همواره وسایل پیشگیری از بارداری در اختیار مددجویان قرار گیرد. در این زمینه موسس می گوید استفاده کنندگان از روشهای پیشگیری از بارداری باید باعوارض جانبی این روش ها آشنا شوند. به عنوان مثال از خونریزی غیر طبیعی و آمنوره در هنگام مصرف آمپولهای پروژسترونی یا خونریزی بیشتر هنگامی که از IUD های مسی استفاده می شوند، آگاه باشند. وی معتقد است که مشکلات غیر قابل انتظار موجب عدم رضایت می شود و این عدم رضایت در اغلب موارد موجب تصمیم به قطع این روش می شود.

تحقیق فوق نشان داد مهمترین مشاورین تنظیم خانواده، پرسنل بهداشتی درمانی (۷۱/۵ درصد) بودند که با نتایج تحقیق ایلدر آبادی تطابق دارد. وی می نویسد مراقبین بهداشتی دارای موقعیتی منحصر به فرد در آگاه کردن خانم ها از خطرات حاملگی های ناخواسته و بیماری های منتقل شونده از راه جنسی هستند(۱۳) و بنابراین میزان

- و عملکرد کارکنان مردگروه صنعتی کفش بلا وملی شهر تهران در زمینه تنظیم خانواده. راز بهزیستن بهار ۱۳۸۲، شماره ۲۴۵، صفحه ۲۱-۲۴.
10. Lachowsky M, Toledoano LR. Improving compliance in oral contraception the reminder card. European journal of contra-ception and reproductive health care, 2002, 7 (4) :210-215.
 11. Lisa J, Edelman K, Alisn J, Jensen P. Satisfaction and the impact on written material about postpartum contraceptive decisions. Am J Obstet Gynecol, 2003: 1202-1204.
 12. شریعتی ماندانی ، محمد پور فریده. بررسی تاثیر آموزش‌های مشاوره‌ای بر روند تنظیم خانواده در خانمهای ۱۵-۴۹ ساله بسترهای در بخش زنان بیمارستان هاجر شهرکرد ، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد ، تابستان ۸۱، دوره چهارم ، شماره ۲ ، صفحه ۳۲-۲۸.
 13. ایلدرآبادی احشق ، هاشمی زهره سادات ، بدخش مهین. بررسی میزان آگاهی کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی شهری از روشهای جلوگیری از بارداری اورزانس ، راز بهزیستی بهار ۱۳۸۲، شماره ۲۴۵، صفحه ۲۱-۲۴.
 - weight in Ecuador. Am J Public Health, 2001; 91 (5): 808-810.
 ۵. محمدپور فریده ، رفیعیان محمود : شیوع و عوامل موثر بر حاملگی ناخواسته در خانمهای مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی هاجر شهرکرد ، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد ، پائیز ۱۳۷۸، دوره اول شماره ۳، صفحه ۲۰-۱۶.
 6. Banerjee N, Sinha A, Kriplani A, et al. Factors determining the occurrence of unwanted pregnancies, Nah Med J India. 2001 14(4): 211-214.
 7. Akila HK, Fahim K, Ibrahim K, Hakim I, Adel H, et al. Lactational amenorrhea as a method of family planning in Egypt, contraception. 2004; 69 (4) : 317-322.
 ۸. کاظمی سید علینقی. کوشای علی. تدین پروین و همکاران. میزان و عمل حاملگی ناخواسته در زن ۵۰۰ باردار مراجعه کننده به بیمارستان شهر زنجان طی سال ۱۳۷۹ ؛ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، زمستان، ۸۰، شماره ۳۷، صفحه ۴۴-۴۹.
 ۹. عباس زاده بزی محمد ، نیکنامی شمس الدین: بررسی میزان تاثیرآموزش بهداشت بر آگاهی ، نگرش